



Wskazania

- ✓ Alergia pokarmowa
- ✓ Nietolerancja pokarmowa
- ✓ Wskazana dla kociąt

Dodatkowe informacje

- + Dieta przeciwalergiczna oparta na jednym źródle białka i węglowodanów (królik i ryż)
- + Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) lub innych niż immunologiczne reakcje (nietolerancji pokarmowej) w formie problemów skórnych lub problemów z trawieniem (biegunka, wymioty)
- + Zmiana na dietę hipoalergiczną pomaga powoli zmniejszyć świąd. To zmniejsza drapanie, tarcie i gryzienie skóry, które mogą spowodować wtórne zmiany skórne

Dodatkowa porada

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem tej diety. Zalecany czas stosowania w przypadku alergii od 3 do 8 tygodni. Kiedy znikną objawy nadwrażliwości, dietę należy stosować do końca życia zwierzęcia w celu zapobiegnięcia ponownego zachorowania.

Przeciwwskazania

- ✗ Nadwrażliwość na białko z królika



Czyste mięso królika i ryż rzadko powodują reakcję alergiczną



Zapewnia specyficzne wymagania pokarmowe kociąt




Ryż jako źródło węglowodanów jest łatwo strawnym pokarmem

Przeciętna analiza (na kilogram)

	Sucha	Mokra
Białko	29,5 %	8,5%
Tłuszcz	19,0 %	5,5%
Popiół	8,0 %	3,0%
Włóknik	1,5 %	1,0%
Wilgotność	8,0 %	80,0%
Węglowodany	34,0 %	2,0%
Witamina A	15 000 IU	2 000 IU
Witamina D3	1 000IU	300 IU
Witamina C	200 mg	
Witamina E	200 mg	40 mg
Wapń	1,3%	0,17%
Fosfor	1,1%	0,13%
Sód	0,55 %	0,04%
Potas	0,74%	0,22%
Cynk	85 mg	16 mg
Linoleic acid	4,3%	
Linolenic acid	0,50%	
Tauryna	1 800 mg	2 500 mg
Energia (ME)	16,1 MJ/kg	3,5 MJ
	3840 kcal	836 kcal

Składniki



Karma sucha: ryż, mączka z mięsa królika, tłuszcz drobiowy, olej rybny, witaminy i pierwiastki śladowe, pulpa buraczana, drożdże

Karma mokra: mięso i podroby (królik), zboża (ryż), pulpa buraczana, minerały, witaminy, oleje i tłuszcze (olej słonecznikowy, olej z oliwek)

Dawki pokarmowe (na dzień)

		2	3	4	5	6
Sucha (gram)	min.	30	45	55	65	75
	max.	40	55	65	75	85
Mokra (gram)	min.	120	155	225	255	300
	max.	155	210	255	315	350

Dawkowanie dla kociąt :

25%-75% wagi ciała kota dorosłego: 1,6 x dawka pokarmowa kota dorosłego
75%-100% wagi ciała kota dorosłego: 1,3 x dawka pokarmowa kota dorosłego